Qué debería saber

Sueño

Cambio de peso

Dejar de tomar el medicamento

¿Es esta medicina la más apropiada para mí?

- Todos los antidepresivos presentados en esta herramienta de decisión son igualmente eficaces para tratar la depresión.
- La mayoría de personas con depresión encuentra un antidepresivo que los hace sentir mejor.
- 6 de cada 10 personas se sentirán mejor con el primer antidepresivo y las otras 4 tendrán que probar otros antidepresivos hasta encontrar el correcto para ellas.


¿Cuánto tiempo tengo que esperar para sentirme mejor?

 Para comenzar a sentir el efecto completo del tratamiento, la mayoría de personas con depresión necesita tomar regularmente el antidepresivo al menos por 6 semanas.


¿Hasta cuando tendré efectos secundarios?

- La mayoría de personas que toma antidepresivos tiene por lo menos un efecto adverso.
- Muchos efectos secundarios desaparecen después de algunas semanas de uso; sin embargo, otros efectos solo desaparecen al dejar de tomar la medicina.


Algunas personas tratadas con antidepresivos pueden experimentar sueño excesivo o insomnio.



Algunas personas pueden tener cambios en su peso. Esto es más probable que ocurra en los primeros seis a doce meses de tratamiento y depende de su peso actual. La tabla a continuación se basa en una persona de 150 libras (68 kilos) de peso.



Dejar de tomar el antidepresivo de un día para otro podría causar que usted se sienta enfermo, como si tuviera gripe (p.ej. dolor de cabeza, mareo, náuseas o ansiedad)




Problemas sexuales


Costo

A tomar en cuenta

Algunas personas tratadas con antidepresivos pueden experimentar pérdida del deseo sexual (líbido) o pérdida de la habilidad para alcanzar el orgasmo.



Estos son los costos estimados y sirven únicamente como referencia. El costo real que usted tendría que pagar puede variar dependiendo de cuándo las compre, la farmacia, su seguro médico, la dosis y la preparación de la medicina.



Los antidepresivos pueden causar:

- · Estreñimiento, diarrea, náuseas
- · Aumento de ideas suicidas e intentos suicidas (18 a 24 años)
- · Daño al feto durante el embarazo
- Riesgo de desarrollar síndrome serotoninérgico, una condición que puede ser mortal (*aunque es menos frecuente)
- · Posible interacción con otros medicamentos

		Adicionalmente
ISRS	Citalopram (Celexa®)	Puede causar problemas del corazón
	Escitalopram (Lexapro®)	Actualmente no presenta problemas
	Fluoxetina (Prozac®)	Mayor probabilidad de interacción con otros medicamentos que usted esté tomando
	Fluvoxamina (Luvox®)	Mayor probabilidad de causar estreñimiento, diarrea o náuseas
		No está oficialmente reconocido como un tratamiento para la depresión
	Paroxetina (Paxil®)	Mayor probabilidad de causar daño al feto durante el embarazo
	Sertralina (Zoloft®)	Mayor probabilidad de causar diarrea
No ISRS	Desvenlafaxina (Pristiq®)	Dígale a su médico si usted tiene presión alta
	Duloxetina	Puede ayudar con el dolor
	(Cymbalta®)	Dígale a su médico si usted tiene presión alta
	Venlafaxina	Mayor probabilidad de causar náuseas y vómitos
	(Effexor®)	Puede causar problemas del corazón
		Digale a su médico si usted tiene presión alta
Otros	Bupropion (Wellbutrin®)	Alto riesgo de convulsiones
	Mirtazapina (Remeron®)	Empieza a actuar más rápido que otros antidepresivos
ပ	Amitriptilina o Nortriptilina	Mayor probabilidad de causar estreñimiento, diarrea o náuseas
AT	(Elavil® o Aventyl HCI®)	Puede ayudar con el dolor

Esta herramienta para la toma decisiones no ha sido financiada por ninguna compañia farmacéutica de salud o de tecnología médica con fines de lucro. Para más detalles visite **shareddecisions.mayoclinic.org**© Mavo Foundation for Medical Education and Research. Última actualización 2017. Todos los derechos reservados.

no ser la mejor opción

Si usted es adulto mayor, esta medicina puede



TOMANDO DECISIONES MÁS SABIAS SOBRE LAS MEDICINAS

Una guía para llevar a la casa, que ayuda a los pacientes a comparar medicinas para la depresión.

Este panfleto resume los mejores estudios de investigación disponibles. Ha sido elaborado por investigadores de la Clínica Mayo sin financiamiento de los fabricantes de medicinas para la depresión.